

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ					
ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΡΟΥ		ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ	ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ	
ΑΓΓΟΥΡΙ	*	Μάρτιος-Απρίλιος	Απρίλιος-Μάιος	100x150	εκ.
ΚΑΡΠΟΥΖΙ	*	Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος	Απρίλιος-Μάιος	150x200	εκ.
ΚΟΜΠΟΚΟΛΟΚΥΘΟ	*	Μάρτιος-Σεπτέμβριος	Απρίλιος-Μάιος	100x80	εκ.
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ	*	Δεκέμβριος-Ιανουάριος	Απρίλιος-Μάιος	80x80	εκ.
ΠΕΠΟΝΙ	*	Απρίλιος-Μάιος	Απρίλιος-Μάιος	150x200	εκ.
ΠΙΠΕΡΙΑ	*	Ιανουάριος	Απρίλιος-Μάιος	80x70	εκ.
ΝΤΟΜΑΤΑ	*	Δεκέμβριος-Ιανουάριος- Μάρτιος	Απρίλιος-Μάιος	80x100-150	εκ.
ΛΑΧΑΝΟ	**	Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος	Αύγουστος-Οκτώβριος	80x80	εκ.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	**	Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος	Αύγουστος-Οκτώβριος	70x80	εκ.
ΜΠΡΟΚΟΛΟ	**	Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος	Αύγουστος-Οκτώβριος	70x80	εκ.
ΣΕΛΙΝΟ (φύλλα)	**	Φεβρουάριος-Οκτώβριος	Σεπτέμβριος	50x70	εκ.
ΣΕΛΙΝΟ (κεφάλι)	**	Φεβρουάριος-Οκτώβριος	Σεπτέμβριος	50x70	εκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Οι σπόροι που σημειώνονται με ένα αστερίσκο μπορούν, για πρόωμη παραγωγή, να φυτευτούν σε ειδικά γλαστράκια ή νάιλον σακουλάκια με ειδικό χώμα και να τοποθετηθούν σε θερμοκήπιο για να αναπτυχθούν και ύστερα να φυτευτούν.

2. Οι σπόροι που σημειώνονται με δύο αστερίσκους, φυτεύονται την κατάλληλη εποχή σε ψυχρά σπορία. Όταν είναι έτοιμα για μεταφύτευση, στην εποχή τους, φυτεύονται στο οριστικό τους μέρος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ				
ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΡΟΥ	ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ	ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ	
ΑΝΗΘΟΣ	Φθινόπωρο-Άνοιξη		σπαρτά	εκ.
ΑΝΤΙΔΙ	Όλο το χρόνο		40x20	εκ.
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Αύγουστος-Οκτώβριος-Δεκέμβριος	Αύγουστος-Οκτώβριος-Δεκέμβριος	100x80	εκ.
ΑΡΑΚΑΣ	Σεπτέμβριος-Άνοιξη		60-70x5-10	εκ.
ΚΑΡΩΤΟ	Φεβρουάριος/Ιούλιος-Νοέμβριος		25x4	εκ.
ΚΟΥΚΙΑ	Οκτώβριος-Νοέμβριος		70x30	εκ.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (σπόρος)	Φεβρουάριος-Μάρτιος		25x10	εκ.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξ-κοκκάρι)	Φεβρουάριος-Μάρτιος	Φεβρουάριος-Μάρτιος	25x10	εκ.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Χ-κοκκάρι)	Οκτώβριος-Φεβρουάριος	Οκτώβριος-Φεβρουάριος	25x5	εκ.
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ	Όλο το χρόνο		σπαρτά	εκ.
ΜΑΡΟΥΛΙ	Αύγουστος-Φεβρουάριος	Σεπτέμβριος-Μάρτιος	40x20	εκ.
ΜΠΑΜΙΑ	Απρίλιος-Μάιος		80x30	εκ.
ΜΠΙΖΕΛΙ	Οκτώβριος-Νοέμβριος		60-80x10-20	εκ.
ΠΑΝΤΖΑΡΙ	Φεβρουάριος/Σεπτέμβριος-Οκτώβριος		30x10	εκ.
ΠΑΤΑΤΑ	Φεβρουάριος-Απρίλιος/Ιούλιος-Αύγουστος	Φεβρουάριος-Απρίλιος/Ιούλιος-Αύγουστος	70x25	εκ.
ΠΡΑΣΟ	Μάρτιος-Μάιος	Ιούνιος-Ιούλιος	30x10	εκ.
ΡΑΔΙΚΙ	Όλο το χρόνο		30x10	εκ.
ΡΑΠΑΝΙ	Αύγουστος-Μάρτιος		20x4	εκ.
ΡΟΚΑ	Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος		σπαρτά	εκ.
ΣΙΝΑΠΙ	Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος		30x10 ή σπαρτά	εκ.
ΣΕΣΚΟΥΛΟ	Μάρτιος-Σεπτέμβριος		40x10	εκ.
ΣΚΟΡΔΟ	Οκτώβριος-Φεβρουάριος	Οκτώβριος-Φεβρουάριος	25x10	εκ.
ΣΠΑΝΑΚΙ	Σεπτέμβριος-Νοέμβριος/Φεβρουάριος		30x10 ή σπαρτά	εκ.
ΦΑΣΟΛΙΑ	Απρίλιος-Αύγουστος		50-100x20-41	εκ.
ΦΡΑΟΥΛΑ	Σεπτέμβριος-Νοέμβριος	Σεπτέμβριος-Νοέμβριος	50x30	εκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οι σπόροι του πιν. 2 σπέρνονται κατ' ευθεία στο οριστικό τους μέρος όπως επεξηγεί ο πίνακας, εκτός από τη φράουλα (μοσχεύματα και ένριζα φυτά).